



Внимание, корь!

Корь является острым инфекционным заболеванием с высоким уровнем восприимчивости среди населения, которое *характеризуется высокой температурой 39° С и выше, кашлем, насморком, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.* Больной человек считается заразным за 4 дня до начала болезни и в течение 4 дней после болезни. Заболевание чаще всего возникает на 10-12 день после контакта с больным корью.

Наибольшую опасность корь представляет для детей первого года жизни (не привитых против кори по возрасту), беременных женщин, так как осложнения инфекции могут привести к младенческой смертности и инвалидности, прерыванию беременности.

Чаще всего осложнения развиваются у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых людей старше 20 лет. Самые серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит (инфекцию, приводящую к отеку головного мозга), тяжелую диарею и связанное с ней обезвоживание, ушные инфекции и тяжелые инфекции дыхательных путей, такие как пневмония.

Основной мерой профилактики кори является вакцинация. В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок дети прививаются в возрасте 12 месяцев и в 6 лет. Вакцинация взрослым в возрасте с 18 до 35 лет (включительно) проводится всем не болевшим корью ранее, не привитым и привитым однократно, а также лицам с неизвестным прививочным анамнезом, вакцинация группы риска (медицинские работники, работники образовательных учреждений и социальной сферы) проводится до 55 лет включительно.